

[이 약을 사용하기 전에 첨부된 문서를 주의깊게 읽으시기 바랍니다.
읽으신 후 버리지 마시고, 이 약과 함께 보관하시기 바랍니다.]

전문의약품

분류번호:131



복합 항염 · 항생 안연고

네오덱스 안연고

NEODEX Ophth Oint.

네오덱스안연고는 항염작용을 나타내는 덱사메타손과 항생물질인 네오마이신 및 폴리믹신B가 처방된 복합제제로써 다양한 원인으로
질에 의해 발생하는 안구 염증을 효과적으로 치료하며, 세균에 의한 2차 감염을 예방하여주는 광범위 복합 항염 · 항생 안연고입니다.

【원료약품 및 그 분량】 이 약 1g 중

· 유효성분 : 덱사메타손(Dexamethasone)(대한민국약전)	0.001g
네오마이신황산염(Neomycin sulfate)(미국약전)	0.0035g
폴리믹신B황산염(Polymyxin B sulfate)(미국약전)	6.000IU
· 첨가제(동물유래성분) : 정제라놀린(양모, 지방)	
· 기타첨가제 : 유동파라핀, 백색바세린	

【성상】 백색 또는 미황색의 안연고

【효능 · 효과】 폴리믹신B황산염 및 네오마이신황산염에 감수성균에 의한 결막염, 안검염, 각막염

【용법 · 용량】 1일 3~4회 결막낭내에 소량 도포하거나 취침시 점안액과 같이 사용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- 1) 표재성 대상포진성 각막염(수지상 각막염)
수두진, 수두, 기타 바이러스에 의한 여러 각막 및 결막질환 환자
- 2) 마이코박테리아의 안과감염, 눈의 진균감염 환자
- 3) 사상균 및 결핵균의 안감염 환자
- 4) 본인이나 가족 중 녹내장의 병력이 있는 환자
- 5) 신생아
- 6) 각막 손상 및 궤양 환자
- 7) 이 약에 과민증 환자
- 8) 각막의 이물질을 잘못 제거한 경우

2. 부작용

- 1) 항균제 및 스테로이드성분에 의하여 알레르기 반응이 일어날 수 있고 각막이나 공막의 박막화를 초래하는 질환에서는 각막이나
공막의 천공이 나타날 수 있습니다.
- 2) 안압 상승이 나타날 수 있습니다.
- 3) 장기사용시 시신경 손상과 시야 및 시력손상이 수반된 녹내장과 후방하 백내장을 일으킬 수 있습니다.
- 4) 장기사용시 스테로이드성분에 의한 숙주반응의 억제로 안감염의 이차적 손상 및 각막의 지속적인 진균 감염을 일으킬 수 있습니다.
- 5) 상처치유를 지연시킬 수 있습니다.
- 6) 눈의 급성화농성 염증질환에서 스테로이드제제는 감염을 은폐하거나 악화시킬 수 있습니다.



3. 일반적 주의

- 1) 콘택트렌즈 착용자는 이 약 투여시 렌즈를 제거하십시오.
- 2) 10일 이상 장기 투여 할 경우, 소아 또는 협조가 잘 안되는 환자라 할지라도 지속적인 안압검사를 하십시오.
- 3) 감염 부위의 재발방지를 위해 증상완화 이후에도 며칠간 지속적으로 치료하는 것이 바람직하나 총 투여기간이 14일을 넘지 않도록 하십시오.
- 4) 투여를 시작한 지 7~8일이 지나도록 증상완화 기미가 보이지 않을 경우 투여를 중지하고 기타 약물 사용을 고려하십시오.
- 5) 스테로이드와 항균제가 함유된 제제의 사용 후에는 2차 감염이 일어날 수 있습니다. 스테로이드를 장기사용하면 각막에 진균감염이 나타나는 수가 있습니다. 스테로이드 투여부위에 지속적인 각막깨양이 나타나면 진균감염을 의심해야 합니다.
- 6) 특히, 이 약 투여 중에 수도 또는 홍역에 감염되면 치명적인 경과에 이를 수 있으므로 다음의 주의가 필요합니다.
 - (1) 이 약 투여 전에 수도 또는 홍역의 병력과 예방접종 유무를 확인하십시오.
 - (2) 수도 또는 홍역의 병력이 없는 환자에 대해서는 수도 또는 홍역에의 감염을 최대한 방지하여 충분한 배려와 관찰을 하십시오. 감염이 의심스러운 경우와 감염된 경우에는 즉시 진찰을 받아 지도하고, 적절한 처치를 하십시오.
 - (3) 수도 또는 홍역의 병력과 예방접종을 받은 적이 있는 환자에서도 이 약 투여 중에 수도 혹은 홍역이 나타날 가능성이 있으므로 유의하십시오.

4. 일부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.
- 2) 모유로의 이행여부는 알려지지 않았으나 수유부에 투여하는 경우 영아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 수유부에는 투여하지 말고 부득이 투여하는 경우에는 수유를 중단하십시오.

5. 적응상의 주의

- 1) 점안용으로만 사용하십시오.
- 2) 점안시 용기의 입구가 직접 눈에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 3) 오염을 방지하기 위해 밀 수 있는 한 공동으로 사용하지 마십시오.

6. 보관 및 취급상의 주의사항.

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관하십시오.
- 3) 오용을 막고 품질의 보증을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

【포장단위】 5g/튜브

【반품 및 교환】

본 제품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회가 고시한 “소비자 분쟁해결기준”에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.

본 설명서 개정년월일 (2017. 06. 16)이후의 변경된 내용은 당사 홈페이지나 상담전화를 통하여 확인하실 수 있습니다.

어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하십시오.

설명서 작성년월일 : '07. 03. 09
설명서 개정년월일 : '17. 06. 16
제품의 사용기한은 외부용기에 표기
P32336-09

제조·판매원
 **한림제약주식회사**
공장:경기도 용인시 처인구 영문로 2-27
<http://www.hanlim.com>

【소비자 상담 창구】

제품문의 및 궁금하신 사항이 있으시면 전화 및 홈페이지 1:1 상담을 이용해주시십시오.

TEL : (02) 3489-6114 홈페이지 : <http://www.hanlim.com>